

## Aula de Exercícios

◆ Cálculo II - MA211

Neemias Martins  
neemias.org/ped   
neemias@ime.unicamp.br 

### ROTACIONAL E DIVERGENTE

#### Exercício 1

Mostre que não existe um campo vetorial  $G$  em  $\mathbb{R}^3$  tal que  
 $\text{rot}(G) = (x \sin y, \cos y, z - xy)$ .

SOLUÇÃO:

Se existe tal campo  $G$ , ele deve satisfazer à igualdade:  $\text{div}(\text{rot}(G)) = 0$ . Mas,

$$\text{div}(\text{rot}(G)) = \sin y - \sin y + 1 = 1 \neq 0.$$

Portanto não existe campo  $G$  com o rotacional dado.

## Exercício 2

Considere o campo

$$F(x, y, z) = (2xy, x^2 + 2yz, y^2).$$

Verifique que o campo vetorial  $F$  é conservativo e calcule  $f(x, y, z)$  tal que  $\nabla f = F$ .

SOLUÇÃO:

$$\text{rot}(F) = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy & x^2 + 2yz & y^2 \end{vmatrix} = (2y - 2y)\vec{i} - (0 - 0)\vec{j} + (2x - 2x)\vec{k} = (0, 0, 0).$$

Como  $\text{rot}(F) = \vec{0}$  e as derivadas parciais de 2ª ordem das funções componentes são contínuas, então  $F$  é conservativo. Logo, existe uma função  $f$  tal que  $\nabla f = F$ .

A fim de determinarmos  $f$ , devemos ter

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 2xy \\ f_y(x, y, z) &= x^2 + 2yz \\ f_z(x, y, z) &= y^2 \end{aligned}$$

Da primeira igualdade, temos

$$\begin{aligned} f_x(x, y, z) &= 2xy \\ \Rightarrow f(x, y, z) &= x^2y + g(y, z) \\ \Rightarrow f_y(x, y, z) &= x^2 + g_y(y, z). \end{aligned}$$

Uma vez que  $f_y(x, y, z) = x^2 + 2yz$  e  $f_y(x, y, z) = x^2 + g_y(y, z)$  obtemos

$$\begin{aligned} x^2 + 2yz &= x^2 + g_y(y, z) \\ \Rightarrow g_y(y, z) &= 2yz \\ \Rightarrow g(y, z) &= y^2z + h(z) \end{aligned}$$

Como  $f(x, y, z) = x^2y + g(y, z)$  e  $g(y, z) = y^2z + h(z)$ , então

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= x^2y + y^2z + h(z) \\ \Rightarrow f_z(x, y, z) &= y^2 + h'(z). \end{aligned}$$

Uma vez que  $f_z(x, y, z) = y^2$  e  $f_z(x, y, z) = y^2 + h'(z)$ , temos

$$\begin{aligned} y^2 &= y^2 + h'(z) \\ \Rightarrow h'(z) &= 0 \\ \Rightarrow h(z) &= K. \end{aligned}$$

Portanto,

$$f(x, y, z) = x^2y + y^2z + K.$$

**Exercício 3**

Calcule a área da superfície dada por

$$\begin{aligned}x &= uv \\y &= u + v \\z &= u - v\end{aligned}$$

com  $u^2 + v^2 \leq 1$ .

**SOLUÇÃO:** Seja  $S$  a superfície parametrizada por

$$r(u, v) = (uv, u + v, u - v); \quad u^2 + v^2 \leq 1.$$

Logo,

$$\begin{aligned}r_u &= (v, 1, 1) \\r_v &= (u, 1, -1)\end{aligned}$$

$$r_u \times r_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v & 1 & 1 \\ u & 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1 - 1)\vec{i} - (-v - u)\vec{j} + (v - u)\vec{k} = (-2, u + v, v - u)$$

$$\begin{aligned}|r_u \times r_v| &= \sqrt{(-2)^2 + (u + v)^2 + (v - u)^2} = \sqrt{4 + u^2 + 2uv + v^2 + u^2 - 2uv + v^2} \\&= \sqrt{4 + 2(u^2 + v^2)}\end{aligned}$$

Portanto,

$$\begin{aligned}A(S) &= \int \int_S 1 \cdot dS = \int \int_D |r_u \times r_v| \, dA \\&= \int \int_{u^2+v^2 \leq 1} \sqrt{4 + 2(u^2 + v^2)} \, du \, dv \\&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{4 + 2\alpha^2} \cdot \alpha \, d\alpha \, d\theta \quad (\text{coordenadas polares}) \\&= \int_0^{2\pi} \left[ \frac{(4 + 2\alpha^2)^{\frac{3}{2}}}{6} \right]_0^1 \, d\theta \quad (*) \\&= [\theta]_0^{2\pi} \cdot \frac{1}{6} \left( 6^{\frac{3}{2}} - 4^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{\pi}{3} \left( 6^{\frac{3}{2}} - 4^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{\pi}{3} (6\sqrt{6} - 8).\end{aligned}$$

(\*) Substituição:  $w = 4 + 2\alpha^2 \Rightarrow \int \sqrt{4 + 2\alpha^2} \cdot \alpha \, d\alpha = \frac{1}{4} \int \sqrt{w} \, dw = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} w^{\frac{3}{2}} + k = \frac{1}{6} w^{\frac{3}{2}} + k$ .

## INTEGRAIS DE SUPERFÍCIE

### Exercício 4

Calcule a integral de superfície

$$\int \int_S (x^2 z + y^2 z) \, dS,$$

sendo  $S$  o hemisfério  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ,  $z \geq 0$ .

**SOLUÇÃO:**

$$\int \int_S f(x, y, z) \, dS = \int \int_D f(r(u, v)) \cdot |r_u \times r_v| \, dA.$$

Para parametrizar a superfície  $S$ , usaremos coordenadas esféricas:

$$x = 2 \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = 2 \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = 2 \cos \varphi$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ e } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

ou seja,

$$r(\varphi, \theta) = (2 \sin \varphi \cos \theta, 2 \sin \varphi \sin \theta, 2 \cos \varphi)$$

$$r_\varphi = (2 \cos \varphi \cos \theta, 2 \cos \varphi \sin \theta, -2 \sin \varphi)$$

$$r_\theta = (-2 \sin \varphi \sin \theta, 2 \sin \varphi \cos \theta, 0)$$

$$r_\varphi \times r_\theta = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 \cos \varphi \cos \theta & 2 \cos \varphi \sin \theta & -2 \sin \varphi \\ -2 \sin \varphi \sin \theta & 2 \sin \varphi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} = (4 \sin^2 \varphi \cos \theta, 4 \sin^2 \varphi \sin \theta, 4 \sin \varphi \cos \varphi)$$

$$|r_\varphi \times r_\theta| = 4 \sin \varphi.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \int \int_S f(x, y, z) \, dS &= \int \int_D f(r(u, v)) \cdot |r_u \times r_v| \, dA \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4 \sin^2 \varphi \cos^2 \theta \cdot 2 \cos \varphi + 4 \sin^2 \varphi \sin^2 \theta \cdot 2 \cos \varphi) \cdot 4 \sin \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \sin^2 \varphi \cdot 2 \cos \varphi \cdot 4 \sin \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 32 \sin^3 \varphi \cos \varphi \, d\varphi d\theta \\ &= [\theta]_0^{2\pi} \cdot 32 \left[ \frac{\sin^4 \varphi}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 16\pi. \end{aligned}$$

### Exercício 5

Calcule a integral de superfície  $\iint_S F \cdot d\vec{S}$  para o campo vetorial  
 $F(x, y, z) = (xy, yz, zx)$ ,

sendo  $S$  a parte do parabolóide  $z = 4 - x^2 - y^2$  que está acima do quadrado  
 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ,  
e com orientação ascendente.

**SOLUÇÃO:**

Parametrização de  $S$ :  $r(u, v) = (u, v, 4 - u^2 - v^2)$ ,  $0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1$ . Então,

$$r_u = (1, 0, -2u)$$

$$r_v = (0, 1, -2v)$$

$$r_u \times r_v = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 0 & -2u \\ 0 & 1 & -2v \end{vmatrix} = (2u, 2v, 1)$$

$$\begin{aligned} F(r(u, v)) \cdot (r_u \times r_v) &= (uv, v(4 - u^2 - v^2), (4 - u^2 - v^2)u) \cdot (2u, 2v, 1) \\ &= 2u^2v + 2v^2(4 - u^2 - v^2) + u(4 - u^2 - v^2) \\ &= 2u^2v + 8v^2 - 2u^2v^2 - 2v^4 + 4u - u^3 - uv^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_S F \cdot d\vec{S} &= \int_0^1 \int_0^1 F(r(u, v)) \cdot (r_u \times r_v) \, du \, dv \\ &= \int_0^1 \int_0^1 2u^2v + 8v^2 - 2u^2v^2 - 2v^4 + 4u - u^3 - uv^2 \, du \, dv \\ &= \int_0^1 \left[ (2v - 2v^2) \frac{u^3}{3} + (8v^2 - 2v^4)u + (4 - v^2) \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{4} \right]_0^1 \, dv \\ &= \int_0^1 \left[ (2v - 2v^2) \frac{1}{3} + 8v^2 - 2v^4 + (4 - v^2) \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right] \, dv \\ &= \left[ \frac{v^2}{3} - \frac{2}{9}v^3 + \frac{8}{3}v^3 - \frac{2}{5}v^5 + 2v - \frac{v^3}{6} - \frac{1}{4}v \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{2}{9} + \frac{8}{3} - \frac{2}{5} + 2 - \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \\ &= \frac{713}{180}. \end{aligned}$$

## EXERCÍCIO EXTRA

### Exercício 6

Calcule  $\iint_S F \cdot d\vec{S}$  sendo  $F(x, y, z) = (0, y, -z)$  e  $S$  dada pelo paraboloide  
 $y = x^2 + z^2$ ,  $0 \leq y \leq 1$

e pelo disco

$$x^2 + z^2 \leq 1, y = 1.$$

**SOLUÇÃO:** Seja  $S_1$  o paraboloide e  $S_2$  o disco. Temos  $S = S_1 \cup S_2$ . Como  $S$  é uma superfície fechada, usaremos a orientação positiva (para fora de  $S$ ).

Temos,

$$\iint_S F \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} F \cdot d\vec{S}.$$

Calcularemos separadamente cada uma das integrais acima.

- Em  $S_1$  :

$$\begin{aligned} r(u, v) &= (u, u^2 + v^2, v), \quad u^2 + v^2 \leq 1 \\ r_u \times r_v &= (2u, -1, 2v) \\ F(r(u, v)) &= (0, u^2 + v^2, -v). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \iint_{S_1} F \cdot d\vec{S} &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} F(r(u, v)) \cdot (r_u \times r_v) \, dA \\ &= \iint_{u^2+v^2 \leq 1} [-(u^2 + v^2) - 2v^2] \, dudv \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 [r^2 + 2r^2 \sin^2 \theta] r \, drd\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 (1 + 2 \sin^2 \theta) \, drd\theta \\ &= - \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 (1 + 1 - \cos(2\theta)) \, drd\theta \\ &= - \left[ 2\theta - \frac{1}{2} \sin(2\theta) \right]_0^{2\pi} \left[ \frac{1}{4} r^4 \right]_0^1 \\ &= -4\pi \cdot \frac{1}{4} \\ &= -\pi. \end{aligned}$$

- Em  $S_2$ , observe que o vetor normal unitário da superfície  $S_2$  é o vetor  $n = (0, 1, 0)$ . (Pois  $S_2$  é um disco de raio 1 no plano-xz, o vetor normal aponta na direção  $y$ ).  
Parametrização:  $x = u$ ,  $y = 1$ ,  $v = z$ ,  $u^2 + v^2 \leq 1$ , ou seja

$$r(u, v) = (u, 1, v), \quad u^2 + v^2 \leq 1.$$

Como  $F(x, y) = (0, y, -z)$ , temos

$$\begin{aligned} F(r(u, v)) &= (0, 1, -v) \\ F(r(u, v)) \cdot n &= (0, 1, -v) \cdot (0, 1, 0) = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int \int_{S_2} F \cdot d\vec{S} &= \int \int_{S_2} F \cdot n \, dS \\
&= \int \int_{u^2+v^2 \leq 1} 1 \, dA \\
&= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r \, dr \, d\theta \\
&= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \\
&= \pi.
\end{aligned}$$

Portanto,  $\int \int_S F \cdot d\vec{S} = -\pi + \pi = 0$ .